

Dosi e modalità di impiego di Minecto Alpha di Syngenta

| Coltura | Insetti bersaglio | Dose (L/ha) | Fase di applicazione | Numero di applicazioni |
|--|--|-------------|-----------------------|---|
| Pomodoro, melanzana, zucchini, melone, cocomero (in serra) | tripidi, aleurodidi, lepidotteri, minatrici fogliari, <i>Tuta absoluta</i> , afidi (solo trattamento fogliare su melanzana, zucchini, melone e cocomero) | 1 | trattamenti fogliari | 1 applicazione/anno dallo stadio vegetativo di 9 foglie alla pre-fioritura. Oppure 2 applicazioni a intervallo di 7 di ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, dallo stadio vegetativo della prima infiorescenza visibile fino alla raccolta |
| | | 0,60 - 0,75 | applicazioni al suolo | 1 applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento, dallo stadio vegetativo di 2 foglie alla raccolta |
| Peperone, cetriolo (in serra) | tripidi, aleurodidi, lepidotteri, minatrici fogliari | 0,60 - 0,75 | applicazioni al suolo | 1 applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento, dallo stadio vegetativo di 2 foglie alla raccolta |
| Lattughe (pieno campo e serra) | tripidi | 1 | trattamenti fogliari | 1 applicazione ogni 2 anni; in pieno campo: dallo stadio di inizio formazione del cespo alla raccolta |
| | lepidotteri | 0,75 | | |
| Lattughe (pieno campo) | tripidi, lepidotteri | 1 | applicazioni al suolo | 1 applicazione ogni 3 anni, dallo stadio vegetativo di 2 foglie a quello di 4 foglie |